

Kills Over 40 Types of Lawn-Invading Insects
AS LISTED

Sta-Green®

Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER
24-0-8

with
Spectracide

TRIAZICIDE

INSECT KILLER

FERTILIZANTE DE VERANO
LIBRE DE FOSFORO, CON INSECTICIDA
SPECTRACIDE® TRIAZICIDE®

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

Elimina los insectos en 24 horas tal como se especifica

- ◆ Specially Formulated for Warm Season Application
Formulado especialmente para su aplicación en temporadas cálidas
- ◆ Kills Ants*, Fleas, Ticks, Chinch Bugs & Sod Webworms
& other listed insects

Elimina hormigas*, pulgas, garrapatas, chinches, gusanos telarañeros del césped y otros insectos especificados



For outdoor residential use only.
Solo para uso residencial en exteriores.

Active Ingredient:
Lambda-Cyhalothrin.....0.03%
Other Ingredients 99.97%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
Precautionary Statements.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black
carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el panel posterior para obtener información
adicional sobre las declaraciones preventivas.



MONEY BACK
Guarantee
MONEY BACK

Net Wt 13 lb (5.8 kg)

GREENS & PROTECTS
DURING SUMMER MONTHS

Sta-Green®

Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER 24-0-8

with
Spectracide

TRIAZICIDE

INSECT KILLER

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

NET WT 13 lb (5.8 kg) • COVERS up to 5,000 sq ft • APPROXIMATELY 1/10 ACRE

Sta-Green®

Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER

24-0-8

with
TRIAZICIDE

INSECT KILLER

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

COVERS up to
5,000 sq ft
Approximately 1/10 Acre

FPO UPC
0 13013 60113 3

FPO UPC
0 13013 60113 3

COVERS up to
5,000 sq ft
Approximately 1/10 Acre

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

Spectracide

TRIAZICIDE

INSECT KILLER

Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER with
24-0-8

Sta-Green®

Sta-Green®

THE STA-GREEN® PROMISE

YOUR SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK!

If you use Sta-Green Phosphorus-Free Summer Fertilizer 24-0-8 with Spectracide® Triazicide® Insect Killer with slow-release nitrogen as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

STOP Read Entire Label Before Use.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP Keep people and pets off treated areas until the material is washed into the turf and grass has dried.

BEFORE YOU APPLY

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf.
- Apply with a fertilizer spreader — **Never apply by hand.**
- Do not apply more than six (6) times per year per location.
- Do not apply before or after rain.

- Do not allow product to run off from target site.
- **In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.**

WHAT IT DOES

Dual-action formula kills insects while feeding your lawn:

1. Exclusive active ingredient works fast and kills lawn-damaging and nuisance insects on contact.
2. Sta-Green Phosphorus-Free Summer Fertilizer 24-0-8 with Spectracide® Triazicide® Insect Killer helps strengthen and protect your lawn from the hot, harsh conditions of summer while improving its tolerance to disease and drought conditions.

WHEN TO APPLY

This product should be applied in the summer when insect activity first appears or when you first notice insect damage.

HOW TO APPLY

1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet and multiply to determine coverage area in square feet, then subtract non-lawn areas. This bag covers up to 5,000 sq ft.
2. Use the spreader setting chart and set spreader to appropriate setting.
3. Apply evenly over dry grass, avoiding streaking, skips and overlaps — thorough coverage is important.
4. Water in after application.
5. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.

Note: The spreader settings listed above are approximate. It is important to check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly. To check calibration accurately weigh a few pounds into your spreader and apply to a measured area. Then adjust spreader setting if necessary, in order to ensure correct rate of application.

NEVER APPLY BY HAND

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

Typically a lawn will utilize 1 to 4 lb of nitrogen per 1,000 sq ft per growing season. When applied at 2.6 lb per 1,000 sq ft, this product provides 0.62 lb of nitrogen per 1,000 sq ft; and when applied at 4 lb per 1,000 sq ft, this product provides 0.96 lb of nitrogen per 1,000 sq ft. Consult your local County Extension Service for questions regarding a regular fertilizer program suitable for your geographical region.

INSECTS CONTROLLED

This product will control the following insects when used as directed:

Ants*, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Billbugs, Centipedes, Chinch bugs, Cockroaches, Crickets, Cutworms, Dung beetles (*Ataenius spretulus*), Earwigs, European crane flies, Fleas, Lawn moths (Sod webworms), Grasshoppers, Green June beetles, Grubs (Japanese beetle grubs), Hyperodes weevils, Japanese beetles (adults), Leafhoppers, Millipedes, Mites, Mole crickets, Palmetto bugs, Pillbugs, Roaches (German and American), Silverfish, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Waterbugs.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

Treatment Areas	Pests	How To Use	Use Rate
Overall Lawn Application	Billbugs, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), <i>Ataenius spretulus</i> (Dung beetles), Hyperodes weevils, mole crickets, Chinch bugs	Immediately water grass thoroughly after application. <i>For Billbug control</i> , apply when activity is first observed or when chewed or brown grass indicates damage from these insects. <i>For Grub control</i> , except Dung beetle, treat any time between late July and early October. <i>For Dung beetle grub control</i> , apply in spring or early summer when damage is first noticed. Water grass thoroughly with ¼ to ½ inch of water immediately after application. Treat again in late summer or early fall if a second generation occurs.	Apply at the rate of 4 lb per 1,000 sq ft of lawn.
	Ants*, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Centipedes, Cockroaches, European Crane flies, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fleas, Lawn moths (Sod webworms), Grasshoppers, Pillbugs, Spittlebugs, Mites, Green June beetles, Leafhoppers, Millipedes, Springtails, Ticks	Apply with a fertilizer spreader. See spreader setting chart. Apply when grass is dry. Water lawn immediately after application.	Apply at the rate of 2.6 lb per 1,000 sq ft (an area 20' by 50').

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

Fire Ant Note: Broadcast applications will control foraging fire ants and help prevent neighboring colonies from re-establishing in your lawn. For best results treat mounds with a mound control product prior to applying this product.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store product in original container in a cool, dry, locked place out of reach of children and pets.

Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

First Aid	
If in Eyes	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.
If Swallowed	• Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.	

Environmental Hazards

This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Use with care when applying to turf areas adjacent to any body of water. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwaters.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatory-info-sb.com>.

Manufactured and guaranteed by Spectrum Group Div. of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

Net Wt 13 lb (5.8 kg)

LA PROMESA DE STA-GREEN®

¡SATISFACCION GARANTIZADA O LA DEVOLUCION DE SU DINERO!

Si utiliza el fertilizante de verano libre de fósforo 24-0-8 de Sta-Green con insecticida Spectracide® Triazicide® y nitrógeno de liberación continua de acuerdo con las instrucciones y no queda completamente satisfecho, envíe el comprobante de compra de este paquete así como el recibo original de la caja registradora a la dirección que aparece más abajo. Le reembolsaremos el costo de su compra.

ALTO Antes de usar este producto lea toda la etiqueta.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

ALTO Mantenga a las personas y mascotas alejadas de las áreas tratadas, hasta que este material sea absorbido y el pasto esté seco.

ANTES DE APLICAR

Lea y siga estas indicaciones cuando use este producto:

- Aplique solo en césped y jardín ornamental.
- Aplique con un esparcidor de fertilizante. **Nunca aplique con la mano.**
- Nunca aplique más de seis (6) veces al año en una misma ubicación.
- No aplique antes o después de la lluvia.

- No permita que el producto se extienda más allá del área de aplicación.
- **En el estado de Nueva York, este producto no puede aplicarse en césped que se encuentre a 30.5 m (100 pies) o menos de una marisma, o de un arroyo que desemboca directamente en una marisma.**

QUE EFECTO TIENE

La fórmula de doble acción elimina insectos y nutre su césped:

1. El ingrediente activo exclusivo actúa rápidamente y elimina por contacto a los insectos molestos que dañan el césped.
2. El fertilizante de verano libre de fósforo 24-0-8 de Sta-Green con insecticida Spectracide® Triazicide® ayuda a fortalecer y proteger el césped de las temperaturas elevadas y las condiciones rigurosas del verano, y mejora la tolerancia a las enfermedades y las condiciones de sequía.

CUANDO APLICAR

Este producto debe aplicarse en el verano, cuando la actividad de los insectos comienza a manifestarse o cuando se notan los primeros daños causados por los insectos.

COMO SE APLICA

1. Determine el tamaño del área que desea tratar: Mida el ancho y el largo en metros (pies), luego multiplique para determinar el área de cobertura en metros cuadrados (pies cuadrados) y, finalmente, reste las áreas no cubiertas por césped. Esta bolsa alcanza para cubrir 464.5 metros cuadrados (5,000 pies cuadrados).
2. Consulte el diagrama de configuración del esparcidor para utilizar la configuración indicada.
3. Aplique uniformemente sobre el pasto seco, evitando vetas, brechas o superposiciones; es importante que la cobertura sea completa.
4. Riegue después de aplicar.
5. Mantenga a los niños y mascotas alejados de las áreas tratadas, hasta que este material sea absorbido y el pasto esté seco.

Nota: Las configuraciones del esparcidor incluidas anteriormente son aproximadas. Revise frecuentemente la calibración del esparcidor, para asegurarse de que el esparcidor esté funcionando apropiadamente y esté aplicando el producto en forma uniforme. Para controlar la calibración con precisión, pese una cantidad pequeña en el esparcidor y aplique en un área medida. Luego, de ser necesario, modifique la configuración del esparcidor, para garantizar la exactitud de la proporción de aplicación.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO

Para evitar brechas y vetas, primero aplique en el borde del césped y luego llene hacia el centro pasando en forma uniforme y paralela. Camine manteniendo el paso de tal forma que se aplique uniformemente a lo largo de todo el césped. Un césped necesita generalmente de 454 g a 1.8 kg (1 a 4 libras) de nitrógeno por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) por período de crecimiento. Cuando se aplica a razón de 1.18 kg (2.6 libras) cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), este producto proporciona 281g (0.62 libras) de nitrógeno cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados); cuando se aplica a razón de 1.8 kg (4 libras) cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), este producto proporciona 435 g (0.96 libras) de nitrógeno cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados). Consulte a su Servicio de Extensión local si tiene preguntas sobre un programa de fertilización regular adecuado para su región geográfica.

INSECTOS CONTROLADOS

Si se utiliza este producto siguiendo las indicaciones, controlará los siguientes insectos:

Hormigas*, gusanos militares (gusano cogollero y a rayas amarillas), gorgojos, ciempiés, chinches, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, escarabajos peloteros (*Ataenius spretulus*), tijeretas, moscas zancudas europeas, pulgas, polillas del césped, saltamontes, mayates, larvas (larvas del escarabajo japonés y del mayate), gorgojos hyperodes, escarabajos japoneses (adultos), saltahojas, milpiés, ácaros, grillos topo, chinche de palmeto, cochinillas, cucarachas (alemanas y americanas), lepismas, cigarras, espumadoras, colémbolos, garrapatas y chinches de agua.

*Argentinas, coloradas del sur, negras, formica essectoides, carpinteras de Florida, carpinteras negras, de maizal, de la miel, de pavimento, coloradas importadas, domésticas

Áreas de aplicación	Plagas	Como usar el producto	Proporción de uso
Aplicación total en el césped	Gorgojos, larvas (larvas del escarabajo japonés y del mayate), <i>Ataenius spretulus</i> (escarabajos peloteros), gorgojos hyperodes, grillos topo, chinches	Riegue todo el pasto inmediatamente después de la aplicación. <i>Para controlar los gorgojos</i> , aplique el producto cuando su actividad comienza a manifestarse o cuando los pastos marrones muestran daños provocados por estos insectos. <i>Para controlar las larvas</i> , excepto las del escarabajo pelotero, aplique el tratamiento en cualquier momento entre fines de julio y principios de octubre. <i>Para controlar las larvas del escarabajo pelotero</i> , aplique en primavera o principios del verano, al notar los primeros daños. Riegue todo el pasto con entre 6.4 y 13 mm (¼ a ½ pulgadas) de agua, inmediatamente después de la aplicación. Vuelva a aplicar el tratamiento a fines del verano o principios del otoño, si se produce una segunda generación.	Aplique el producto a una proporción de 1.8 kg (4 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) de césped.
	Hormigas*, gusanos militares (gusano cogollero y a rayas amarillas), ciempiés, cucarachas, moscas zancudas europeas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, polillas del césped, saltamontes, cochinillas, cigarras espumadoras, ácaros, mayates, saltahojas, milpiés, colémbolos, garrapatas	Aplique con un esparcidor de fertilizante. Consulte el diagrama de configuración del esparcidor. Aplique el producto cuando el césped esté seco. Riegue el césped inmediatamente después de la aplicación.	Aplique el producto a una proporción de 1.18 kg (2.6 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), un área de 6.1 por 15.2 m (20 por 50 pies).

*Argentinas, coloradas del sur, negras, formica essectoides, carpinteras de Florida, carpinteras negras, de maizal, de la miel, de pavimento, coloradas importadas, domésticas

Nota sobre las hormigas coloradas: Las aplicaciones al voleo controlarán a las hormigas coloradas forrajeras y ayudarán a prevenir que las colonias vecinas se vuelvan a establecer en el césped. Para obtener los mejores resultados, aplique un producto para control de hormigueros en estos montículos antes de aplicar este producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

Almacenamiento: Almacene el producto en el recipiente original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Eliminación: Si el producto está vacío: no vuelva a usar el envase. Tirelo en la basura o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Es nocivo para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Causa una irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto, y antes de comer, beber, masticar chicle o consumir tabaco.

Primeros auxilios

Si entra en contacto con los ojos	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
Si se ingiere	• Consulte a un centro de control de envenamientos o a un médico inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenamientos o un médico. No le administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los peces y sumamente tóxico para otros organismos acuáticos, incluidos ostras y langostinos. Aplíquese con cuidado en áreas de jardín adyacentes a cualquier masa de agua. Los derrames y los escurrimientos de las áreas tratadas pueden afectar de manera adversa a los organismos acuáticos en las adyacencias. No aplique el producto directamente en el agua. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el drenaje fuera de las áreas tratadas. No contamine el agua cuando limpie los equipos o deseché las aguas utilizadas para el lavado.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad de seguridad y del uso indebido de este producto si no se siguen las instrucciones indicadas.

EPA Reg. No. 9688-220-8845
EPA Est. Nos. 9198-OH-1(M), 9198-OH-2(B), 9198-AL-1(A),
49991-TX-1(AZ), 49991-TX-2(BE), 45065-MN-1(BE),
59144-GA-1(BE), 6665-NY-1(BE), 35512-FL-2(BE),
8378-IN-1(AS), 43854-MO-1(BE), 49710-TX-1(AT),
49710-TX-3(AL), 3234-UT-1(AV), 3234-AZ-1(AV),
74764-CA-1(BK), 74764-FL-1(BL), 9404-FL-1(AX),
35497-OR-1(AV), 8660-AL-1(BN), 8660-OH-1(BO)
Circled letter is first letter of lot number.
11-10877 © 2007 UIC

Sta-Green®

Keep an Eye Out for Insects

Chinch bugs are one of the most widespread and damaging of the summer lawn insects. If a sunny area of your lawn begins to turn brown and the area gets larger even though you are providing ample water you may want to check for chinch bugs. Go to the edge of the blighted area, pull the grass open and look for black and white adults or reddish colored juveniles scurrying about near the soil surface.

GUARANTEED ANALYSIS

24-0-8

Total Nitrogen (N)..... 24.0%
24.0% Urea Nitrogen**
Soluble Potash (K₂O)..... 8.0%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated Sulfur-coated Urea, Urea and Muriate of Potash.

**Contains 10.9% slowly available Nitrogen from coated Urea.

F1074

LOOK!

for other quality Sta-Green lawn & garden products. For more information, visit us on our website at www.sta-green.com or call our Consumer Service Hotline at 1.877.341.9620.

¡BUSQUE!

otros productos de calidad de Sta-Green para el cuidado del césped y el jardín. Para obtener más información visite nuestro sitio web en www.sta-green.com o llame a nuestra línea de información para el cliente al 1.877.341.9620.

1-877-341-9620

PROOF OF PURCHASE
COMPROBANTE DE COMPRA



13013 60113 3

COVERS ^{UP} 5,000 sq ft • APPROXIMATELY 1/10 ACRE

Kills Over 40 Types of Lawn-Invading Insects
AS LISTED



Sta-Green®

Phosphorus-Free

**SUMMER
FERTILIZER**

24-0-8

with
Spectracide

TRIAZICIDE

INSECT KILLER

FERTILIZANTE DE VERANO
LIBRE DE FOSFORO, CON INSECTICIDA
SPECTRACIDE® TRIAZICIDE®

Sta-Green®

SUMMER FERTILIZER

Phosphorus-Free

24-0-8

with **TRIAZICIDE**

INSECT KILLER

KILLS INSECTS

FPO UPC
0 13013 60113 3

**COVERS UP TO
5,000 sq ft**
Approximately 1/40 Acre

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

TRIAZICIDE
INSECT KILLER

with
Spectracide

TRIAZICIDE

INSECT KILLER

FERTILIZANTE DE VERANO
LIBRE DE FOSFORO, CON INSECTICIDA
SPECTRACIDE® TRIAZICIDE®

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

Elimina los insectos en 24 horas tal como se especifica

- ◆ Specially Formulated for Warm Season Application
Formulado especialmente para su aplicación en temporadas cálidas
- ◆ Kills Ants*, Fleas, Ticks, Chinch Bugs & Sod Webworms
& other listed insects

Elimina hormigas*, pulgas, garrapatas, chinches, gusanos telarañeros del césped y otros insectos especificados



For outdoor residential use only.
Solo para uso residencial en exteriores.

Active Ingredient:.....0.03%
Other Ingredients 99.97%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
Precautionary Statements.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black
carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Consulte el panel posterior para obtener información
adicional sobre las declaraciones preventivas.



MADE IN USA

MONEY BACK
Guarantee
MONEY BACK

GREENS & PROTECTS
DURING SUMMER MONTHS

Net Wt 13 lb (5.8 kg)



Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER 24-0-8

with
Spectracide

TRIAZICIDE INSECT KILLER

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

NET WT 13 lb (5.8 kg) • COVERS ^{UP} 5,000 sq ft • APPROXIMATELY ¹/₁₀ ACRE

KILLS INSECTS IN 24 HOURS
AS LISTED

COVERS
^{UP} **5,000 sq ft**
Approximately ¹/₁₀ Acre

FPO UPC
0 13013 60113 3

Phosphorus-Free
SUMMER FERTILIZER with
TRIAZICIDE INSECT KILLER
24-0-8
Sta-Green

Sta-Green®

THE STA-GREEN® PROMISE

YOUR SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK!

If you use Sta-Green Phosphorus-Free Summer Fertilizer 24-0-8 with Spectracide® Triazicide® Insect Killer with slow-release nitrogen as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and the original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

STOP Read Entire Label Before Use.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

STOP Keep people and pets off treated areas until the material is washed into the turf and grass has dried.

BEFORE YOU APPLY

Read and follow these guidelines when you use this product:

- Apply only to lawns and ornamental turf.
- Apply with a fertilizer spreader — **Never apply by hand.**
- Do not apply more than six (6) times per year per location.
- Do not apply before or after rain.
- Do not allow product to run off from target site.
- **In New York State, this product may not be applied to lawns within 100 ft of a coastal marsh, or stream that drains directly into a coastal marsh.**

WHAT IT DOES

Dual-action formula kills insects while feeding your lawn:

1. Exclusive active ingredient works fast and kills lawn-damaging and nuisance insects on contact.
2. Sta-Green Phosphorus-Free Summer Fertilizer 24-0-8 with Spectracide® Triazicide® Insect Killer helps strengthen and protect your lawn from the hot, harsh conditions of summer while improving its tolerance to disease and drought conditions.

WHEN TO APPLY

This product should be applied in the summer when insect activity first appears or when you first notice insect damage.

HOW TO APPLY

1. Determine size of area to be treated — measure length and width in feet and multiply to determine coverage area in square feet, then subtract non-lawn areas. This bag covers up to 5,000 sq ft.
2. Use the spreader setting chart and set spreader to appropriate setting.
3. Apply evenly over dry grass, avoiding streaking, skips and overlaps — thorough coverage is important.
4. Water in after application.
5. Keep children and pets off treated areas until this material is washed into turf and grass is dry.

Note: The spreader settings listed above are approximate. It is important to check calibration of spreader frequently to ensure spreader is functioning properly and applying product evenly. To check calibration accurately weigh a few pounds into your spreader and apply to a measured area. Then adjust spreader setting if necessary, in order to ensure correct rate of application.

NEVER APPLY BY HAND

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

Typically a lawn will utilize 1 to 4 lb of nitrogen per 1,000 sq ft per growing season. When applied at 2.6 lb per 1,000 sq ft, this product provides 0.62 lb of nitrogen per 1,000 sq ft; and when applied at 4 lb per 1,000 sq ft, this product provides 0.96 lb of nitrogen per 1,000 sq ft. Consult your local County Extension Service for questions regarding a regular fertilizer program suitable for your geographical region.

INSECTS CONTROLLED

This product will control the following insects when used as directed:

Ants*, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Billbugs, Centipedes, Chinch bugs, Cockroaches, Crickets, Cutworms, Dung beetles (*Ataenius spretulus*), Earwigs, European crane flies, Fleas, Lawn moths (Sod webworms), Grasshoppers, Green June beetles, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), Hyperodes weevils, Japanese beetles (adults), Leafhoppers, Millipedes, Mites, Mole crickets, Palmetto bugs, Pillbugs, Roaches (German and American), Silverfish, Spittlebugs, Springtails, Ticks and Waterbugs.

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

Treatment Areas	Pests	How To Use	Use Rate
Overall Lawn Application	Billbugs, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), <i>Ataenius spretulus</i> (Dung beetles), Hyperodes weevils, mole crickets, Chinch bugs	Immediately water grass thoroughly after application. <i>For Billbug control</i> , apply when activity is first observed or when chewed or brown grass indicates damage from these insects. <i>For Grub control</i> , except Dung beetle, treat any time between late July and early October. <i>For Dung beetle grub control</i> , apply in spring or early summer when damage is first noticed. Water grass thoroughly with ¼ to ½ inch of water immediately after application. Treat again in late summer or early fall if a second generation occurs.	Apply at the rate of 4 lb per 1,000 sq ft of lawn.
	Ants*, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Centipedes, Cockroaches, European Crane flies, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fleas, Lawn moths (Sod webworms), Grasshoppers,	Apply with a fertilizer spreader. See spreader setting chart. Apply when grass is dry. Water lawn immediately after application.	Apply at the rate of 2.6 lb per 1,000 sq ft (an area 20' by 50').

LA PROMESA DE STA-GREEN®

¡SATISFACCION GARANTIZADA O LA DEVOLUCION DE SU DINERO!

Si utiliza el fertilizante de verano libre de fósforo 24-0-8 de Sta-Green con insecticida Spectracide® Triazicide® y nitrógeno de liberación continua de acuerdo con las instrucciones y no queda completamente satisfecho, envíe el comprobante de compra de este paquete así como el recibo original de la caja registradora a la dirección que aparece más abajo. Le reembolsaremos el costo de su compra.

ALTO Antes de usar este producto lea toda la etiqueta.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

ALTO Mantenga a las personas y mascotas alejadas de las áreas tratadas, hasta que este material sea absorbido y el pasto esté seco.

ANTES DE APLICAR

Lea y siga estas indicaciones cuando use este producto:

- Aplique solo en césped y jardín ornamental.
- Aplique con un esparcidor de fertilizante. **Nunca aplique con la mano.**
- Nunca aplique más de seis (6) veces al año en una misma ubicación.
- No aplique antes o después de la lluvia.
- No permita que el producto se extienda más allá del área de aplicación.
- **En el estado de Nueva York, este producto no puede aplicarse en césped que se encuentre a 30.5 m (100 pies) o menos de una marisma, o de un arroyo que desemboca directamente en una marisma.**

QUE EFECTO TIENE

La fórmula de doble acción elimina insectos y nutre su césped:

1. El ingrediente activo exclusivo actúa rápidamente y elimina por contacto a los insectos molestos que dañan el césped.
2. El fertilizante de verano libre de fósforo 24-0-8 de Sta-Green con insecticida Spectracide® Triazicide® ayuda a fortalecer y proteger el césped de las temperaturas elevadas y las condiciones rigurosas del verano, y mejora la tolerancia a las enfermedades y las condiciones de sequía.

CUANDO APLICAR

Este producto debe aplicarse en el verano, cuando la actividad de los insectos comienza a manifestarse o cuando se notan los primeros daños causados por los insectos.

COMO SE APLICA

1. Determine el tamaño del área que desea tratar: Mida el ancho y el largo en metros (pies), luego multiplique para determinar el área de cobertura en metros cuadrados (pies cuadrados) y, finalmente, reste las áreas no cubiertas por césped. Esta bolsa alcanza para cubrir 464.5 metros cuadrados (5,000 pies cuadrados).
2. Consulte el diagrama de configuración del esparcidor para utilizar la configuración indicada.
3. Aplique uniformemente sobre el pasto seco, evitando vetas, brechas o superposiciones; es importante que la cobertura sea completa.
4. Riegue después de aplicar.
5. Mantenga a los niños y mascotas alejados de las áreas tratadas, hasta que este material sea absorbido y el pasto esté seco.

Nota: Las configuraciones del esparcidor incluidas anteriormente son aproximadas. Revise frecuentemente la calibración del esparcidor, para asegurarse de que el esparcidor esté funcionando apropiadamente y esté aplicando el producto en forma uniforme. Para controlar la calibración con precisión, pese una cantidad pequeña en el esparcidor y aplique en un área medida. Luego, de ser necesario, modifique la configuración del esparcidor, para garantizar la exactitud de la proporción de aplicación.

NUNCA APLIQUE CON LA MANO

Para evitar brechas y vetas, primero aplique en el borde del césped y luego llene hacia el centro pasando en forma uniforme y paralela. Camine manteniendo el paso de tal forma que se aplique uniformemente a lo largo de todo el césped.

Un césped necesita generalmente de 454 g a 1.8 kg (1 a 4 libras) de nitrógeno por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) por período de crecimiento. Cuando se aplica a razón de 1.18 kg (2.6 libras) cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), este producto proporciona 281 g (0.62 libras) de nitrógeno por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados); y cuando se aplica a razón de 1.8 kg (4 libras) cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), este producto proporciona 435 g (0.96 libras) de nitrógeno por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados). Consulte a su Servicio de Extensión local si tiene preguntas sobre un programa de fertilización regular adecuado para su región geográfica.

INSECTOS CONTROLADOS

Si se utiliza este producto siguiendo las indicaciones, controlará los siguientes insectos:

Hormigas*, gusanos militares (gusano cogollero y a rayas amarillas), gorgojos, ciempiés, chinches, cucarachas, grillos, gusanos cortadores, escarabajos peloteros (*Ataenius spretulus*), tijeretas, moscas zancudas europeas, pulgas, polillas del césped, saltamontes, mayates, larvas (larvas del escarabajo japonés y del mayate), gorgojos hyperodes, escarabajos japoneses (adultos), saltahojas, milpiés, ácaros, grillos topo, chinche de palmeto, cochinillas, cucarachas (alemanas y americanas), lepismas, cigarras espumadoras, colémbolos, garrapatas y chinches de agua.

*Argentinas, coloradas del sur, negras, fórmica exsecoides, carpinteras de Florida, carpinteras negras, de maizal, de la miel, de pavimento, coloradas importadas, domésticas

Áreas de aplicación	Etiquetas	Como usar el producto	Proporción de uso
Aplicación total en el césped	Gorgojos, larvas (larvas del escarabajo japonés y del mayate), <i>Ataenius spretulus</i> (escarabajos peloteros), gorgojos hyperodes, grillos topo, chinches	Riegue todo el pasto inmediatamente después de la aplicación. <i>Para controlar los gorgojos</i> , aplique el producto cuando su actividad comienza a manifestarse o cuando los pastos marrones muestran daños provocados por estos insectos. <i>Para controlar las larvas</i> , excepto las del escarabajo pelotero, aplique el tratamiento en cualquier momento entre fines de julio y principios de octubre. <i>Para controlar las larvas del escarabajo pelotero</i> , aplique en primavera o principios del verano, al notar los primeros daños. Riegue todo el pasto con entre 6.4 y 13 mm (¼ a ½ pulgadas) de agua, inmediatamente después de la aplicación. Vuelva a aplicar el tratamiento a fines del verano o principios del otoño, si se produce una segunda generación.	Aplique el producto a una proporción de 1.8 kg (4 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) de césped.
	Hormigas*, gusanos militares (gusano cogollero y a rayas amarillas), ciempiés, cucarachas, moscas zancudas europeas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, polillas del césped, saltamontes, cochinillas, cigarras espumadoras, ácaros, mayates, saltahojas, milpiés, colémbolos, garrapatas	Aplique con un esparcidor de fertilizante. Consulte el diagrama de configuración del esparcidor. Aplique el producto cuando el césped esté seco. Riegue el césped inmediatamente después de la aplicación.	Aplique el producto a una proporción de 1.18 kg (2.6 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), un área de

*Argentina, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

Treatment Areas	Pests	How To Use	Use Rate
Overall Lawn Application	Billbugs, Grubs (Japanese beetle grubs, Green June beetle grubs), <i>Ateatus spretulus</i> (Dung beetles), Hyperodes weevils, mole crickets, Chinch bugs	Immediately water grass thoroughly after application. For <i>Billbug control</i> , apply when activity is first observed or when chewed or brown grass indicates damage from these insects. For <i>Grub control</i> , except Dung beetle, treat any time between late July and early October. For <i>Dung beetle grub control</i> , apply in spring or early summer when damage is first noticed. Water grass thoroughly with ¼ to ½ inch of water immediately after application. Treat again in late summer or early fall if a second generation occurs.	Apply at the rate of 4 lb per 1,000 sq ft of lawn.
	Ants*, Armyworms (Fall & Yellow-striped), Centipedes, Cockroaches, European Crane flies, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fleas, Lawn moths (Sod webworms), Grasshoppers, Pillbugs, Spittlebugs, Mites, Green June beetles, Leafhoppers, Millipedes, Springtails, Ticks	Apply with a fertilizer spreader. See spreader setting chart. Apply when grass is dry. Water lawn immediately after application.	Apply at the rate of 2.6 lb per 1,000 sq ft (an area 20' by 50').

*Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, red imported fire ant, nuisance

Fire Ant Note: Broadcast applications will control foraging fire ants and help prevent neighboring colonies from re-establishing in your lawn. For best results treat mounds with a mound control product prior to applying this product.

STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store product in original container in a cool, dry, locked place out of reach of children and pets.

Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if swallowed. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

First Aid

If in Eyes

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

If Swallowed

- Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor, or going for treatment.

Sta-Green

Turf Note

Keep an Eye Out for Insects

Chinch bugs are one of the most widespread and damaging of the summer lawn insects. If a sunny area of your lawn begins to turn brown and the area gets larger even though you are providing ample water you may want to check for chinch bugs. Go to the edge of the blighted area, pull the grass open and look for black and white adults or reddish colored juveniles scurrying about near the soil surface.

GUARANTEED ANALYSIS

24-0-8

Total Nitrogen (N)..... 24.0%

24.0% Urea Nitrogen**

Soluble Potash (K₂O)..... 8.0%

Derived from: Polymer-coated Urea, Polymer-coated

Sulfur-coated Urea, Urea and Muriate of Potash.

**Contains 10.9% slowly available Nitrogen from coated Urea.

F1074

Environmental Hazards

This product is toxic to fish and highly toxic to other aquatic organisms including oysters and shrimp. Use with care when applying to turf areas adjacent to any body of water. Drift and runoff from treated turf may adversely affect aquatic organisms in adjacent aquatic sites. Do not apply directly to water. Do not apply when weather conditions favor drift from treated areas. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwaters.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

When applied as directed, this product meets the guidelines for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.regulatory-info-sb.com>.

Manufactured and guaranteed by Spectrum Group Div. of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

Net Wt 13 lb (5.8 kg)



*Argentina, coloradas del sur, negras, formica essectoides, carpinteras de Florida, carpinteras negras, de maizal, de la miel, de pavimento, coloradas importadas, domesticas

Áreas de aplicación	riagas	Como usar el producto	proporcion de uso
Aplicación total en el césped	Gorgojos, larvas (larvas del escarabajo japonés y del mayate), <i>Ateatus spretulus</i> (escarabajos peloteros), gorgojos hyperodes, grillos topo, chinches	Riegue todo el pasto inmediatamente después de la aplicación. Para controlar los gorgojos, aplique el producto cuando su actividad comienza a manifestarse o cuando los pastos marrones muestran daños provocados por estos insectos. Para controlar las larvas, excepto las del escarabajo pelotero, aplique el tratamiento en cualquier momento entre fines de julio y principios de octubre. Para controlar las larvas del escarabajo pelotero, aplique en primavera o principios del verano, al notar los primeros daños. Riegue todo el pasto con entre 6.4 y 13 mm (¼ a ½ pulgadas) de agua, inmediatamente después de la aplicación. Vuelva a aplicar el tratamiento a fines del verano o principios del otoño, si se produce una segunda generación.	Aplique el producto a una proporción de 1.8 kg (4 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados) de césped.
	Hormigas*, gusanos militares (gusano cogollero y a rayas amarillas), ciempiés, cucarachas, moscas zancudas europeas, grillos, gusanos cortadores, tijeretas, pulgas, polillas del césped, saltamontes, cochinillas, cigarras espumadoras, ácaros, mayates, saltahojas, miripieds, colembolos, garrapatas	Aplique con un esparcidor de fertilizante. Consulte el diagrama de configuración del esparcidor. Aplique el producto cuando el césped esté seco. Riegue el césped inmediatamente después de la aplicación.	Aplique el producto a una proporción de 1.18 kg (2.6 libras) por cada 93 metros cuadrados (1,000 pies cuadrados), un área de 6.1 por 15.2 m (20 por 50 pies).

*Argentinas, coloradas del sur, negras, formica essectoides, carpinteras de Florida, carpinteras negras, de maizal, de la miel, de pavimento, coloradas importadas, domesticas

Nota sobre las hormigas coloradas: Las aplicaciones al voleo controlarán a las hormigas coloradas forrajeras y ayudarán a prevenir que las colonias vecinas se vuelvan a establecer en el césped. Para obtener los mejores resultados, aplique un producto para control de hormigueros en estos montículos antes de aplicar este producto.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Almacene el producto en el recipiente original en un lugar fresco, seco y bajo llave fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Eliminación: Si el producto está vacío: no vuelva a usar el envase. Tirelo en la basura o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción.

Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Es nocivo para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se ingiere. Causa una irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto, y antes de comer, beber, masticar chicle o consumir tabaco.

Primeros auxilios

Si entra en contacto con los ojos

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Si se ingiere

- Consulte a un centro de control de envenamientos o a un médico inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenamientos o un médico. No le administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Cuando llame a un centro de control de envenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los peces y sumamente tóxico para otros organismos acuáticos, incluidos ostras y langostinos. Aplíquese con cuidado en áreas de jardín adyacentes a cualquier masa de agua. Los derrames y los escurrimientos de las áreas tratadas pueden afectar de manera adversa a los organismos acuáticos en las adyacencias. No aplique el producto directamente en el agua. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el drenaje fuera de las áreas tratadas. No contamine el agua cuando limpie los equipos o deseché las aguas utilizadas para el lavado.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad de seguridad y del uso indebido de este producto si no se siguen las instrucciones indicadas.

EPA Reg. No. 9688-220-8845

EPA Est. Nos. 9198-OH-1(M), 9198-OH-2(B), 9198-AL-1(A),

49991-TX-1(AZ), 49991-TX-2(B), 45065-MN-1(B),

59144-GA-1(B), 6665-NY-1(B), 35512-FL-2(B),

8378-IN-1(AS), 43854-MO-1(B), 49710-TX-1(AT),

49710-TX-3(AL), 3234-UT-1(AV), 3234-AZ-1(AV),

74764-CA-1(BK), 74764-FL-1(B), 9404-FL-1(A),

35497-OR-1(AV), 8660-AL-1(BN), 8660-OH-1(B)

Circled letter is first letter of lot number.

11-10877 © 2007 UIC

Sta-Green

Nota sobre el césped

Controle la actividad de los insectos

Las chinches son unos de los insectos más extendidos y nocivos de los que se encuentran en el césped en verano. Si un área del césped que recibe luz solar comienza a ponerse cada vez más marrón, a pesar de que recibe suficiente agua, es recomendable que compruebe si hay chinches. Abra el pasto del área infestada y busque chinches adultos negros y blancos, o chinches jóvenes coloradas cerca de la superficie de la tierra.

PROOF OF PURCHASE
COMPROBANTE DE COMPRA



0 13013 60113 3

COVERS UP TO 5,000 sq ft • APPROXIMATELY 1/10 ACRE